



**Amino acid.  
Solución inyectable.  
500ml.**

**Reg. SAGARPA Q-7665-011**

**FÓRMULA:**

Cada 100 ml. de solución acuosa:

Dextrosa H<sub>2</sub>O 5.0 g.

Acetate Sódico 3H<sub>2</sub>O 250.0 mg.

Sulfato de Magnesio 7H<sub>2</sub>O 200.0 mg.

Cloruro de Potasio 200.0 mg.

Cloruro de Calcio 2H<sub>2</sub>O 150.0 mg.

Niacinamida 150.0 mg.

Piridoxina (B6) 10.0 mg.

Tiamina (B1) 10.0 mg.

Cianocobalamina (B12) 5.0 mcg.

Dexpanthenol 5.0 mg.

Riboflavina (B2) 4.0 mg.

L-Leucina 187.0 mg.

L-Lisina HCl 70.0 mg.

L-Acido Glutámico 136.0 mg.

L-Valina 135.0 mg.

L-Fenilalanina 119.0 mg.

L-Arginina HCl 85.0 mg.

L-Isoleucina 85.0 mg.

L-Treonina 78.2 mg.

L-Histidina HCl 58.5 mg.

L-Metionina 51.0 mg.

L-Cisteina HCl 50.0 mg.



Con vehículo a base de agua Propilen glicol 2.5%, Sorbitol 2.5%, Ácido Lactico 0.16%, Ácido Citrico 0.1%, BHA 0.005% Metilparabeno 0.18%, Propilparabeno 0.02%, y Etilparabeno 0.01% (Conservadores).

**INDICACIONES:**

Como fuente de aminoácidos esenciales, Vitaminas del Complejo B, Electrólitos y Dextrosa, como terapia de soporte en rehidratación, estimulante del metabolismo y como fuente de energía. (Diarreas, neumonías, convalecencia, carencia de los ingredientes, estrés o animales sometidos a trabajos forzados. En bovinos y equinos.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

La dosis recomendada en bovinos y equinos adultos es de 50 a 500 ml. (Administrar de 6 a 8 ml. por cada Kg. de peso), dependiendo del tamaño y condición.

Se puede administrar por vía intravenosa lenta, subcutánea, intraperitoneal y vía oral.

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase es un lugar fresco y oscuro, debajo de los 30° C. Evite la congelación.

Consulte al Médico Veterinario.

Distribuidor autorizado:

Covet Pharma.

Avenida Vidriera Querétaro No. 8, Fraccionamiento industrial,

El pueblito, Corregidora Querétaro, México, CP: 76900.