



**CEFTIOLEBS 50.
SOLUCION INTYECTABLE**

REG. SAGARPA 6895-023

FÓRMULA:

Ceftiofur HCl 50 mg.



INDICACIONES:

Bovinos y ovinos: Indicado en el tratamiento del complejo respiratorio bovino (CRB); neumonías asociadas a *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* (*Mannheimia* spp.), *Haemophilus somnus*, y en el tratamiento de necrobacilosis interdigital agudo (gabarro, pododermatitis) asociado con *Fusobacterium* y *Bacteroides*.

Porcinos: Indicado para el tratamiento del complejo respiratorio porcino (CRP), asociado a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Streptococcus suis* tipo 2, síndrome de falla reproductiva bacteriana piógena del porcino (cistitis, nefritis, pielonefritis, endometritis y síndrome de la cerda flaca), tratamiento postparto para controlar y reducir los problemas reproductivos como síndrome MMA, descargas vulvo/vaginales reduciendo el intervalo de destete primer servicio.

Ceftiolebs 50 RTU contiene ceftiofur clorhidrato antibiótico de la familia de las cefalosporinas, con actividad bactericida in vitro como resultado de la inhibición de la síntesis de la pared celular y efectivo contra bacterias gram negativas, con gran actividad contra las bacterias gram positivas incluyendo las bacterias que producen β -lactamasa como a continuación se señalan:

- Staphylococcus intermedius
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus agalactiae
- Streptococcus bovis
- Streptococcus dysgalactiae
- Streptococcus suis
- Streptococcus uberis
- Streptococcus zooepidermicus
- Streptococcus faecalis
- Pasteurella multocida
- Mannheimia haemolytica
- Haemophilus spp.
- Actinobacillus pleuropneumoniae
- Salmonella choleraesuis
- Escherichia coli
- Fusobacterium necrophorum
- Bacteroides fragilis
- Moraxella bovis
- Archanobacter pyogenes
- Enterococcus spp.
- Clostridium spp.
- Klebsiella spp.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: 1 ml de Ceftiolebs 50 RTU por cada 50 Kg. de peso vivo. (Equivalente a 1 mg de Ceftiofur por Kg. de peso vivo) vía subcutáneas, intramuscular o intravenosa. La inyección puede repetirse cada 24 horas por un lapso mínimo de 3 a 5 días. Las aplicaciones subsiguientes deben de administrarse en diferentes sitios.

Porcinos: 1 ml. de Ceftiolebs 50 RTU por cada 16 - 32 Kg. de peso vivo. (Equivalente a 2-3 mg de Ceftiofur por cada Kg. de peso vivo) vía subcutáneas, intramuscular o intravenosa. El tratamiento debe repetirse a intervalos de 24 horas por un lapso de 3 a 5 días. Las aplicaciones subsiguientes deben de administrarse en diferentes sitios.

Ovinos y caprinos: 1 ml de Ceftiolebs 50 RTU por cada 50 Kg. de peso vivo. (Equivalente a 1 mg de Ceftiofur por Kg. de peso vivo) vía subcutáneas, intramuscular o intravenosa. La inyección puede repetirse cada 24 horas por un lapso mínimo de 3 a 5 días. Las aplicaciones subsiguientes deben de administrarse en diferentes sitios.

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:

La leche de vacas tratadas para consumo humano puede emplearse durante el tratamiento de las vacas. No requiere tiempo de retiro en leche.

No deben sacrificarse los animales para consumo humano durante el tratamiento. Estos deben sacrificarse después de 48 horas de la última aplicación.

Consulte al Médico Veterinario.

Distribuidor autorizado:

Covet Pharma.

Avenida Vidriera Querétaro No. 8, Fraccionamiento industrial,

El pueblito, Corregidora Querétaro, México, CP: 76900.