



## GENTAMICINA PLUS

Solución inyectable

Reg. SAGARPA Q-6895-001

### FÓRMULA:

Cada ml. contiene:

Gentamicina sulfato 120 mg.

(equivalente a Gentamicina base)

Vehículo c.b.p. 1 ml.



### INDICACIONES:

Antimicrobiano de amplio espectro usado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por bacterias Gram-negativas y estafilococos, asociados en neumonías, diarreas, mastitis, metritis, pielonefritis, infecciones de la piel y septicemias en todas las especies, causadas por microorganismos sensibles a la Gentamicina.

#### DOSIS:

Aplicar de 5 a 8 mg. por Kg. de peso vivo (1 ml. por cada 20 Kg. de peso) cada 12 horas por vía intramuscular o intravenosa, peritoneal, subcutánea durante 3 a 5 días.

En el tratamiento de mastitis: Diluya de 1 a 2 ml. de Gentamicina Plus en 10 ml. de solución Ringer, administrándose en forma de infusión intramamaria en el cuarto afectado utilizando una cánula estéril.

En el tratamiento de metritis: Diluya de 2 a 10 ml. de Gentamicina Plus en 40 a 60 ml. de Lactated Ringer, administrándose por infusión intrauterina.

En el tratamiento de infecciones gastrointestinales de lechones: Prepare una solución con 5 ml. de Gentamicina Plus y 95 ml. de Lactate Ringers y de ésta solución aplique 1 ml. por vía intramuscular y oral cada 24 horas durante 3 a 5 días.

#### PRESENTACION:

Frasco 100 ml.

Frasco 250 ml.

#### ADVERTENCIAS:

No se use este producto 20 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. Así mismo, no deberá consumirse la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 4 días después de la última aplicación.

Consulte al Médico Veterinario.

Distribuidor autorizado:

Covet Pharma.

Avenida Vidriera Querétaro No. 8, Fraccionamiento industrial,

El pueblito, Corregidora Querétaro, México, CP: 76900.